

RENGED PUEDE SER PERJUDICIAL PARA EL FETO

- Con objeto de asegurar que se evite la exposición fetal a **RENGED**, su médico cumplimentará la Tarjeta del paciente para documentar que se le ha informado de la **importancia de que su pareja NO se quede embarazada durante el tratamiento con RENGED** y hasta 4 semanas después de que el paciente varón finalice el tratamiento, ya que de llegar a término el embarazo, **el feto podría tener malformaciones graves que pondrían en peligro su vida.**
- **No debe compartir nunca RENGED con otras personas.**
- Debe devolver siempre todas las cápsulas no utilizadas.
- **No debe donar semen durante el tratamiento y hasta 4 semanas después** de finalizarlo.
- Los efectos secundarios graves más frecuentes de RENGED son una reducción del número de células sanguíneas que luchan contra las infecciones y también de las células sanguíneas que intervienen en la coagulación de la sangre.
- Por este motivo, su médico indicará que le realicen **análisis de sangre todas las semanas**, al menos durante las 8 primeras semanas de tratamiento. RENGED también puede causar trombosis (formación de coágulos de sangre en las venas). Por lo tanto, **debe informar a su médico inmediatamente en el caso de que experimente:**

- **Fiebre, escalofríos, dolor de garganta, tos, úlceras en la boca o cualquier otro síntoma de infección.**
- **Hemorragia (sangrado) o hematomas (moretones) en ausencia de lesiones.**
- **Dolor torácico (de pecho) o de piernas.**
- **Dificultad para respirar.**

- Si manifiesta algún otro efecto secundario mientras está tomando Lenalidomida Kemex deberá informar a su médico.
- **Se desconoce si RENGED pasa al semen en humanos.** Si su pareja tiene la posibilidad de quedarse embarazada y no utiliza un método anticonceptivo eficaz, debe utilizar preservativos durante el tratamiento y al menos, hasta **4 semanas** después de finalizar el tratamiento, **aunque usted esté vasectomizado.**
- **Si a pesar de tomar las precauciones debidas su pareja se queda embarazada** mientras usted está tomando **RENGED, debe informar inmediatamente al médico** responsable de su tratamiento.