

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO

- Si está embarazada, cree que puede estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, **no debe tomar RENGED puesto que puede ser perjudicial para el feto.**
- Si tiene la posibilidad de quedarse embarazada, **debe seguir todas las medidas necesarias para evitar el embarazo** y asegurar que no se quede embarazada durante el tratamiento. Antes de iniciar el tratamiento, **debe asegurarse con su médico si puede quedarse embarazada**, aunque crea que es improbable.
- Si tiene la posibilidad de quedarse embarazada, **se le realizarán pruebas de embarazo bajo la supervisión de su médico, antes del tratamiento.**

Estas pruebas se repetirán cada 4 semanas durante el tratamiento y 4 semanas después de finalizar el tratamiento, a menos que se confirme que usted está esterilizada quirúrgicamente.

- Si tiene la posibilidad de quedarse embarazada, debe utilizar **2 métodos anticonceptivos** eficaces durante las **4 semanas anteriores al inicio** del tratamiento, así como **durante el tratamiento** y hasta **4 semanas después de finalizar el tratamiento**. Su médico le informará de los métodos anticonceptivos adecuados, puesto que **algunos tipos de anticonceptivos no están recomendados** durante el tratamiento con **RENGED**. Por consiguiente, es fundamental que comente este aspecto con su médico.

Si sospecha que está embarazada en cualquier momento durante el tratamiento con RENGED o en las 4 semanas siguientes a su terminación, debe dejar de tomar RENGED inmediatamente e informar rápidamente a su médico.