

RENGED PUEDE SER PERJUDICIAL PARA EL FETO

- Con objeto de asegurar que se evite la exposición fetal a **RENGED**, su médico cumplimentará la Tarjeta del paciente para documentar que se le ha informado de la **importancia de que NO se quede embarazada durante el tratamiento con RENGED y hasta un mes después de finalizar el tratamiento, ya que de llegar a término el embarazo, el feto podría tener malformaciones graves que pondrían en peligro su vida.**
- **No debe compartir nunca RENGED con otras personas.**
- Debe devolver siempre todas las cápsulas no utilizadas.
- **Los efectos secundarios graves más frecuentes de RENGED** son una reducción del número de células sanguíneas que luchan contra las infecciones y también de las células sanguíneas que intervienen en la coagulación de la sangre.
- Por este motivo, su médico indicará que le realicen **análisis de sangre todas las semanas**, al menos durante las 8 primeras semanas de tratamiento. **RENGED** también puede causar trombosis (formación de coágulos de sangre en las venas). Por lo tanto, **debe informar a su médico inmediatamente en el caso de que experimente:**

- **Fiebre, escalofríos, dolor de garganta, tos, úlceras en la boca o cualquier otro síntoma de infección.**
- **Hemorragia (sangrado) o hematomas (moretones) en ausencia de lesiones.**
- **Dolor torácico (de pecho) o de piernas.**
- **Dificultad para respirar.**

- Si manifiesta algún otro efecto secundario mientras está tomando **RENGED** deberá informar a su médico.